



43 Bloemenblok

Introductie

Een bloemenblok dient 's zomers en 's winters als foerageergebied voor akkervogels in open akkergebieden en biedt jaarrond dekking. Een bloemenblok is in de winter ook belangrijk voor overwinterende akkervogels zoals kneu en groenling, en daarnaast onder meer aantrekkelijk voor muizen, die op hun beurt weer een belangrijke prooi zijn voor muizen etende vogels zoals torenvalk en uilen.



Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit ingezaaide kruiden en eventueel ook granen.

Algemene beheervorschriften

- De beheereenheid is minimaal 0,5 en maximaal 1,0 hectare groot en indien dit beheerpakket uitgevoerd wordt als rand is de rand minimaal 20 meter breed.
- In april van het eerste jaar wordt de beheereenheid ingezaaid met het door het collectief voorgeschreven zaadmengsel en de voorgeschreven zaaidichtheid.
- In april van het derde groeiseizoen wordt de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. In het vierde groeiseizoen volgt de andere helft.
- De beheereenheid wordt niet gemaaid of beweid. Gedeeltelijk maaien buiten het broedseizoen is toegestaan in overleg met het collectief.
- De beheereenheid mag niet worden bemest.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden open akkerland bij agrarisch natuurbeheer. Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) chemisch worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel en Jacobskruid.
- In goed overleg tussen deelnemer en het Collectief kunnen activiteiten bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van nieuwe inzichten ten aanzien van het ecologisch doelbereik die gedurende de beheerperiode opgedaan worden door zowel deelnemer als het Collectief.

Beheerpakket en beheervergoeding

43. Bloemenblok		Vergoeding per hectare per jaar	
		Klei/veen	Zand
43a	Bloemenblok	€ 3.150	€ 2.844,-



Bloemenblok

