



## 16 Meerjarige vogelakker

### Introductie

Vogelakkers zijn bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen, maar ook broedende veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door vogelakkers aangetrokken.

Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op dezelfde plek liggen, zodat de muizenpopulatie zich kan opbouwen. Een vogelakker moet na een paar jaar vernieuwd of verplaatst worden. Voor het laatste jaar kan pakketvariant b gebruikt worden, zodat in het najaar de grond bewerkt kan worden.



### Beheereisen

- **Pakket a:** Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 31 december uit de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie van deze.
- **Pakket b:** Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie van deze.

### Aanvullende beheervorschriften

- Het gewas en de natuurstroken worden in stroken naast elkaar geteeld in de verhouding 75% gewas en 25% natuurbraakstroken waarbij de natuurbraakstroken gemiddeld minimaal 12 en maximaal 18 meter breed zijn.
- Invulling natuurbraakstroken:
  - De natuurbraakstroken liggen 'in' het perceel en worden ingezaaid met door het collectief voorgeschreven zaadmengsels.
  - De natuurstroken mogen alleen gemaaid worden in de periode 1 maart tot 1 april. Buiten deze periode is maaien alleen toegestaan na goedkeuring van het collectief.
  - Aan het begin van het derde en vierde groeiseizoen van de beheereenheid wordt telkens 50% van de oppervlakte natuurbraakstroken opnieuw ingezaaid met door het collectief voorgeschreven zaadmengsels.
  - Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) chemisch worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel en Jacobskruiskruid.
- Het 'gewas' kan ingevuld worden door de volgende gewassen met bijbehorende beheervorschriften:
  - Luzerne of rode klaver: 2-4 maal maaien: 1e maaibeurt na 1 juni en 2e maaibeurt na 15 juli. Bemesting met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan.
  - Productief kruidenrijk grasland: : 2-4 maal maaien: 1e maaibeurt na 1 juni en 2e maaibeurt na 15 juli. Bemesting met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan.
  - Zomergranen: Gebruik van herbiciden volgens protocol gebruik herbiciden open akkerland; bewust gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, en zodat het past binnen een gangbaar bouwplan.



- Wintergranen: Gebruik van herbiciden volgens protocol gebruik herbiciden open akkerland; bewust gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, en zodat het past binnen een gangbaar bouwplan. Inzaaihoeveelheid van maximaal 190 zaden per m<sup>2</sup>, oftewel 76 kg/ha, Inzaai op regels met een afstand van minimaal 19 cm.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer.

#### **Beheerpakketten en beheervergoedingen**

<b>16. Vogelakker</b>		<b>Vergoeding per hectare per jaar</b>	
		<b>Klei/veen</b>	<b>Zand</b>
16a	Vogelakker, meerjarig	€ 2.622,-	€ 1.990,-
16b	Vogelakker, meerjarig – laatste jaar	€ 2.622,-	€ 1.990,-